

Não é carnaval, mas falemos de Cuícas

Categories : [Fauna e Flora](#)

Quem acompanha o nosso [Blog do Wikiparques](#) sabe da incrível biodiversidade da [Reserva Biológica Estadual do Sassafrás](#) e já conferiu a [galeria com vários exemplares](#). No meio de insetos, tamanduás e anfíbios, está um animal bem peculiar: a **cuíca (*Gracilinanus microtarsus*)**.

Ela tem pelos longos e macios, na maior parte marrom-avermelhado e a base cinza. No dorso, a pelagem é mais clara, como também é no rosto. Possuem anéis escuros ao redor dos olhos negros, amplos e proeminentes. A parte anterior do pescoço é alaranjada. A cauda, preênsil e escamosa, é marrom e as patas, esbranquiçadas, com dedos são relativamente longos, com pequenas garras. É um animal pequeno: tem 105 a 110 mm de comprimento da cabeça e corpo e cauda de 145 a 153 mm. Têm uma massa entre 10 e 45 gramas.

São [marsupiais](#) da família [Didelphidae](#) à qual pertencem os gambás, catitas e cuícas. A cuíca *Gracilinanus microtarsus* é [encontrada apenas](#) no Brasil, natural dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul.

Vivem nas florestas úmidas da Mata Atlântica e florestas caducifólias espalhadas nas regiões do sul do Cerrado. A espécie tem hábitos predominantemente arborícola e noturno. Solitários, passam os dias descansando em ocos de árvores. Quando em atividade, frequentemente [forrageiam](#) no solo. A locomoção é feita a passos curtos e rápidos, com o auxílio da cauda preênsil.

A sua dieta é composta principalmente por insetos, mas podem se alimentar de comer algumas aranhas, caracóis, e até mesmo frutas. O *G. microtarsus* atua como importante dispersor das sementes de espécies da família das [áraceas](#) em uma área de Mata Atlântica.

A reprodução da cuíca se inicia nos meses de maior pluviosidade. As fêmeas entram em cio uma vez por ano, entre agosto e setembro, e têm ninhadas de até doze filhotes, que nascem durante a estação chuvosa, quando o alimento é abundante. A mãe não possui uma bolsa, mas um conjunto de cerca de 14 mamas. Os filhotes são desmamados após três meses de idade, entre novembro e dezembro.

Os jovens crescem, até os seis meses de idade, e atingem a maturidade sexual com um ano. A maioria das cuícas não sobrevive por muito mais tempo do que um ano, mas podem chegar a dois anos de idade. Além do pouco tempo de vida, têm que lidar com seus predadores: [jaguatiricas](#), [gatos-do-mato](#), [guaraxains](#), [lobos-guará](#) e [gaviões-de-rabo-branco](#).

A cuíca *G. microtarsus* está listada pela [IUCN](#) como [pouco preocupante](#), em razão da sua tolerância à modificação de habitat, o que faz presumir uma grande população: como forrageia com sucesso no chão, é menos afetada pela fragmentação de habitats florestais que as demais espécies animais puramente arbóreas.

Leia também

[Rabo-branco-acanelado, o eremita dos planaltos](#)

[Guácharos: pequenos demônios](#)

[Drymoreomys albimaculatus, o rato da serra](#)